

КАРТА НА ПАЦИЕНТА

**В СЛУЧАЙ НА СПЕШНОСТ,
МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА:**

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Лекаря, предписващ ZypAdhera® (ЗипАдхера)

(име, телефон):

Практика/болница

(име, телефон): _____

Име: _____

Телефон: _____

Име: _____

Телефон: _____

Поддържащо лечение на възрастни
пациенти с шизофрения, които са
достатъчно стабилизирани при
лечение с перорален оланзапин.

МОЛЯ ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ И АКТУАЛИЗИРАЙТЕ ТОЗИ СПИСЪК С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ СЛЕД ВСЯКО ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ЛЕКАР (ВКЛЮЧИТЕЛНО В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТ).

Предписани лекарства

Дата: _____

Име на лекарството	Доза (mg, единици, впръсквания, капки)	Кога приемате Вашето лекарство? (Колко пъти на ден? Сутрин и вечер? След ядене?)	Дати (Начало / Край)	Цел (Защо го приемате?)

ZypAdhera® (ЗипАдхера)

Доза (mg)	Колко често получавате Вашата инжекция?	Дата на последната инжекция	Час на последната инжекция

За важна информация за безопасност, погледнете обратната страна и цялата предоставена информация за предписания продукт

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ

ZypAdhera® (ЗипАдхера) може понякога да проникне в кръвообращението прекалено бързо и да доведе до следните нежелани ефекти: прекомерна сънливост, замаяност, объркване, дезориентация, говорни затруднения, затруднения при ходене, мускулна скованост или треперене, обща слабост, раздразнителност, агресия, тревожност, повишаване на кръвното налягане, гърчове или безсъзнание.

По тази причина:

- Всеки път, когато Ви поставят инжекция, ще бъдете наблюдаван от лекуващия Ви лекар или медицинска сестра поне 3 часа за евентуална поява на някой от изброените по-горе симптоми.
- Преди да напуснете лекарския кабинет, лекуващия Ви лекар или медицинска сестра трябва да се уверят, че при Вас липсват каквито и да е от изброените по-горе симптоми.

- Макар и малко вероятно, можете да получите симптоми и след като вече са изминали повече от 3 часа от инжектирането. Ако това се случи, свържете се с Вашия лекар или медицинска сестра незабавно.
- Поради наличието на горепосочения риск, не шофирайте и не работете с машини до края на всеки от дните, в които Ви поставят инжекция.

Докато сте все още в лекарския кабинет или клиниката, не пропускайте да кажете на лекуващия Ви лекар или медицинска сестра, ако се чувствате:

- много сънлив
- замаян
- объркан или дезориентиран
- раздразнителен или агресивен
- тревожен, или:

- имате говорни затруднения или затруднения при ходене
- чувствате обща слабост
- имате мускулна скованост или треперене

Вашият лекар или медицинска сестра са длъжни да Ви направят щателен преглед, за да се уверят, че сте контактен и нямате каквито и да е симптоми, преди да напуснете клиниката, както и да Ви обяснят какво да правите, в случай че някой от тези нежелани ефекти се появи след като вече сте напуснали лечебното заведение.

Допълнителна информация за ZypAdhera® (ЗипАдхера) може да бъде намерена в Листовката с информация за пациента.

Както всички лекарства и ZypAdhera® (ЗипАдхера) може да причини при някои от пациентите нежелани реакции.

Чести нежелани реакции: засягат 1 до 10 на 100 пациенти

- ZypAdhera (ЗипАдхера) може понякога да проникне в кръвообращението прекалено бързо и да доведе до следните нежелани ефекти: прекомерна сънливост, замаяност, объркване, дезориентация, говорни затруднения, затруднения при ходене, мускулна скованост или треперене, обща слабост, раздразнителност, агресия, тревожност, повишение на кръвното налягане, гърчове, или безсъзнание.
- Сънливост
- Болка на мястото на инжектиране

Нежеланите лекарствени реакции, изброени по-долу, са наблюдавани при приемане на оланзапин през устата, но могат да настъпят и след инжекционното приложение на ZypAdhera (ЗипАдхера).

Много чести нежелани реакции: засягат 1 на 10 пациенти

- Повишаване на телесното тегло
- Сънливост
- Повишаване на нивата на хормона пролактин в кръвта
- В началото на лечението някои хора могат да почувстват замаяност или слабост (със забавяне на сърдечната честота), особено при изправяне от легнало или седнало положение. Това обикновено преминава от само себе си, но ако това не стане, уведомете Вашия лекар.

Чести нежелани реакции:

засягат 1 до 10 на 100 пациенти

- Промени в броя на някои кръвни клетки и в нивата на липидите в кръвта
- Повишаване на нивата на захарта в кръвта и урината
- Повишаване на нивата на пикочната киселина и креатинфосфокиназата в кръвта
- Засилено чувство за глад
- Замаяност
- Безпокойство
- Треперене
- Необичайно движение (дискинезии)
- Запек
- Сухота в устата
- Обрив
- Загуба на сила
- Прекомерна умора
- Задръжка на вода, водеща до подуване на китките, глезените или ходилата
- висока температура
- болки в ставите
- сексуални дисфункции, като намалено либидо при мъже и жени или еректилна дисфункция при мъже

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции се задълбочи или ако забележите други, неописани в тази карта, моля информирайте Вашия лекуващ лекар.

Допълнителна информация за ZypAdhera® (ЗипАдхера) може да бъде намерена в Листовката с информация за пациента.



ДАННИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Име: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Информация за връзка при спешност:
