

NÄIDUSTUS

ZYPADHERA™ on näidustatud skisofreenia säilitusraviks täiskasvanud patsientidel, kellel on suukaudse olansapiinraviga skisofreenia piisavalt stabiliseeritud.



Nagu kõik ravimid, võib ka ZYPADHERA™ põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad mõjutada 1 kuni 10 kasutajat 100st

- Zypadhera võib mõnikord jõuda vereringesse liiga kiiresti. Kui see juhtub, võite te pärast süstimist tunda allpool loetletud kõrvaltoimeid. Mõnikord võivad need sümptomid põhjustada teadvuse kadu:
 - ülemäärane unisus, pearinglus, segasus, desorienteeritus, kõnelemisraskused, kõndimisraskused, lihasjäikus või värisemine, nõrkus, ärrituvus, agressiivsus, ärevus, vererõhu tõus või krambid
- unisus
- süstekoha valu

Allpool loetletud kõrvaltoimeid on täheldatud olansapiini suukaudse manustamise järgselt, kuid neid võib esineda ka Zypadhera manustamise järgselt.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad mõjutada 1 kasutajat 10st

- kehakaalu tõus
- unisus
- prolaktiini taseme tõus veres
- ravi varajases staadiumis võivad mõned inimesed tunda peeringlust või minestada (koos südame töö aeglustumisega), eriti kui nad tõusevad üles istuvast või lamavast asendist. Tavaliselt läheb see ise üle, kui aga mitte, rääkige sellest palun arstile.

Teised sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada 1 kuni 10 kasutajat 100st)

- muutused mõnede vererakkude ja veres ringlevate rasvade hulgas ja ravi varajases staadiumis maksaensüümide aktiivsuse ajutine tõus
- suhkru taseme tõus veres ja uriinis
- kusihappe ja kreatiinfosfokinaasi taseme tõus veres
- tugevam nälgjatunne
- peapööritus
- rahutus
- värisemine
- ebatavalised liigutused (düskineesia)
- kõhukinnisus
- suukuivus
- nahalööve
- jõuetus
- ülemäärane väsimus
- vedelikupeetus, mis põhjustab käte, pahklude või labajalgade turset
- palavik
- liigesevalu
- seksuaalsuse häired, nt libiido langus meestel ja naistel või erektsioonihäired meestel

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate kõrvaltoimet, mida ei ole siin teabelehes nimetatud, rääkige sellest kohe palun arstile. Täiendavat teavet Zypadhera kohta leiate pakendi infolehest.

TÄHTIS TEAVE PATSIENDILE

Zypadhera võib mõnikord liiga kiiresti vereringesse jõuda ja see võib kaasa tuua järgmiste kõrvaltoimete tekke: ülemäärane unisus, pearinglus, segasus, desorienteeritus, kõnelemisraskused, kõndimisraskused, lihasjäikus või värisemine, nõrkus, ärrituvus, agressiivsus, ärevus, vererõhu tõus või krambid ning võib tekkida teadvusekadu.

Seetõttu:

- Iga kord, kui te saate süsti, jälgib arst või õde teid vähemalt 3 tundi ülalloetletud sümptomite suhtes.
- Teie arst või õde peavad enne teie lahkumist olema veendunud, et teil ei esine ühtki nendest sümptomitest.
- See on küll ebatõenäoline, kuid teil võivad need sümptomid tekkida ka hiljem, kui 3 tundi pärast süstimist. Kui see peaks juhtuma, võtke kohe oma arsti või õega ühendust.
- Selle ohu tõttu ärge juhtige pärast süsti saamist sellel päeval enam autot ega kasutage masinaid.

Kui te olete veel arsti kabinetis või haiglas, peate te kindlasti arstile või õele ütlema, kui te

- tunnete, et olete väga unine
- tunnete, et pea käib ringi
- tunnete, et olete segaduses või desorienteeritud
- tunnete, et olete ärritatud või agressiivne
- tunnete, et olete ärevuses
- teil on raskusi rääkimise või kõndimisega
- tunnete nõrkust
- teil on lihased jäigad või värisevad

Teie arst või õde peavad teid enne haiglast lahkumist kontrollima, veendumaks, et te olete ergas ja teil ei esine mingeid sümptomeid ning nad selgitavad teile, mida teha, kui need tekivad pärast teie haiglast lahkumist.

Täiendavat teavet Zypadhera kohta leiate pakendi infolehest.

TEIE SÜSTIMINE

Nimi:

Aadress:

Telefon:

Esmaabi kontakti info:

.....

.....

ERAKORRALISE JUHTUMI KORRAL
HELISTAGE PALUN:

ZYPADHERA™ väljakirjutanud arst
(nimi, haigla, tel. number):

.....

.....

.....

Nimi:

Tel:

Nimi:

Tel:

ÜKSKÕIK, MILLAL TE OMA ARSTI VÕI MÕNE ERIALA SPETSIALISTI JUURDE LÄHETE (KA SIIS, KUI TEIL ON OLNUD ÕNNETUS JA TE OLETE SATTUNUD TRAUMAPUNKTI),
UUENDAGE SEDA RAVIMITE LOETELU KOOS ARSTIGA.

MÄÄRATUD RAVIMID: KUUPÄEV:

RAVIMI NIMETUS	ANNUS <i>mg, ühik, pihustus, tilgad</i>	MILLAL TE SEDA VÕTATE? <i>Mitu korda päevas? Hommikul ja õhtul? Pärast sööki?</i>	KUUPÄEVAD <i>algus / lõpp</i>	EESMÄRK <i>Miks te seda ravimit võtate?</i>

ZYPADHERA™

ANNUS (<i>mg</i>)	KUI SAGELI TE SÜSTE SAATE?	VIIMASE SÜSTI KUUPÄEV	VIIMASE SÜSTI AEG

NÄIDUSTUS
ZYPADHERA™ on näidustatud skisofreenia
säilitusraviks täiskasvanud patsientidel,
kellel on suukaudse olansapiinraviga
skisofreenia piisavalt stabiliseeritud.

