

ZYPADHERA-hoidosta vastaava lääkäri
(lääkärin nimi, vastaanoton/sairaalan
nimi, puhelinnumero):

Nimi

Puhelinnumero

Nimi

Puhelinnumero

**AINA KUN KÄYT LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA (MYÖS PÄIVYSTYKSESSÄ), KÄY KÄYTÖSSÄSI OLEVAT LÄÄKKEET LÄPI YHDESSÄ LÄÄKÄRISI
KANSSA JA TEHKÄÄ YHDESSÄ TARVITTAVAT KORJAUKSET.**

Reseptilääkkeet Päivämäärä: _____

Lääkkeen nimi	Annos <i>Mg/yksikköä/ sumutteen annos/tippaa</i>	Milloin otat lääkkeen? <i>Montako kertaa päivässä? Aamuin ja illoin? Aterian jälkeen?</i>	Päivämäärät <i>Aloitus- ja mahdollinen lopetusajankohta</i>	Käyttötarkoitus <i>Miksi käytän lääkettä?</i>

ZYPADHERA™

Annos <i>(mg)</i>	Kuinka usein saat pistoksen?	Edellinen pistos, pvm	Edellinen pistos, klo

Lue kääntöpuoli sekä ZYPADHERA-pakkausseloste. Niissä on tärkeää turvallisuuteen liittyvää lisätietoa.

KÄYTTÖAIHE

Skitsofrenian pitkäaikaishoitoon
aikuispotilailla, joiden tila on
riittävästi stabiloitunut suun kautta
otettavalla olantsapiinilla hoidon
akuutissa vaiheessa.

KÄYTTÖAIHE

Skitsofrenian pitkäaikaishoitoon aikuispotilailla, joiden tila on riittävästi stabiloitunut suun kautta otettavalla olantsapiiniinilla hoidon akuutissa vaiheessa.



Kuten kaikki lääkkeet, myös ZYPADHERA voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittatapahtumat: koskevat 1 – 10 käyttäjää 100:sta

- ZYPADHERA voi joskus joutua verenkiertoon liian nopeasti. Jos näin käy, silloin saattaa ilmetä seuraavassa lueteltuja oireita pistoksen jälkeen. Joissakin tapauksissa oireet voivat aiheuttaa tajuttomuutta.
 - Voimakas väsymys, huimaus, sekavuus, ajan ja paikan tajun heikkeneminen, puhumis- ja/tai kävelyvaikeudet, lihasjäykkyys, tai lihasvapina, voimattomuus, ärtyneisyys, vihamielisyys, ahdistuneisuus, verenpaineen nousu tai kouristukset

- Uneliaisuus
- Pistospaikan kipu.

Seuraavassa lueteltavat oireet ovat ilmenneet potilailla, jotka ovat ottaneet olantsapiinia suun kautta. Ne voivat kuitenkin ilmaantua myös ZYPADHERA-pistoksen jälkeen.

Hyvin yleiset haittavaikutukset: koskevat 1 käyttäjää 10:stä

- Painon lisäys
- Uneliaisuus
- Veren prolaktiinipitoisuuden suureneminen
- Hoidon alussa jotkut potilaat voivat tuntea huimausta tai pyörtyä (samalla sydämen syke on hidas), etenkin kun he nousevat pystyyn makuu- tai istuma-asennosta. Tämä häviää yleensä itsestään, mutta jos vaiva jatkuu, keskustele lääkärin kanssa.

Yleiset haittavaikutukset: koskevat 1 – 10 käyttäjää 100:sta

- Joidenkin verisolujen määrän ja veren rasva-arvojen muutokset sekä hoidon alussa maksan entsyymien väliaikainen nousu
- Verensokerin ja virtsaan menevän sokerin määrän suureneminen
- Virtsahapon ja kreatiniini fosfokinaasin määrän nousu veressä
- Nälän tunne
- Huimaus
- Rauhattomuus
- Vapina
- Poikkeavat liikkeet (dyskinesia)
- Ummetus
- Suun kuivuminen
- Ihottuma
- Voimattomuus
- Voimakas uupumus
- Nesteen kertyminen ja siitä johtuvat turvotukset käsissä, nilkoissa tai jaloissa

- Kuume
- Nivelkipu
- Seksuaalisten toimintojen häiriöt miehillä ja naisilla kuten libidon lasku ja miehillä erektio-ongelmat.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille. Lisätietoja pakkausselosteessa.

TÄRKEÄÄ TIETOA POTILAALLE

ZYPADHERA voi joskus päästä verenkiertoon liian nopeasti ja tämä voi aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia: voimakas väsymys, huimaus, sekavuus, ajan ja paikan tajun heikkeneminen, puhumis- ja/tai kävelyvaikeudet, lihasjäykkyys, tai lihasvapina, voimattomuus, ärtyneisyys, vihamielisyys, ahdistuneisuus, verenpaineen nousu tai kouristukset. Oireet voivat johtaa tajuttomuuteen.

Tämän vuoksi on tärkeää, että:

- Jokaisen pistoksen jälkeen lääkäri tai hoitaja seuraa tilaasi ainakin 3 tuntia yllälueteltujen oireiden varalta.
- Lääkäri tai hoitaja tarkistaa, ettei Sinulla ole yllälueteltuja oireita ennen kuin lähdet.
- Voit saada yllälueteltuja oireita myös myöhemmin kuin 3 tuntia pistoksen jälkeen, vaikka tämä on epätodennäköistä. Jos saat näitä oireita, ota heti yhteys lääkäriin tai hoitajaan.
- Koska haittavaikutusten mahdollisuus on olemassa, Sinun ei pidä ajaa autoa eikä käyttää koneita enää samana päivänä pistoksen saamisen jälkeen.

Kun olet hoitopaikassa, kerro lääkärille tai hoitajalle jos

- Olet hyvin uneliais
- Sinua huimaa tai pyörryttää
- Tunnet olevasi sekava tai hämmentynyt
- Olet ärtynyt tai vihamielinen
- Olet ahdistunut
- Sinun on vaikea puhua tai kävellä
- Tunnet olevasi heikko
- Tunnet että lihaksesi ovat jäykät tai ne vapisevat.

Lääkärin tai hoitajan on tarkistettava, että olet valpas ja ettei Sinulla ole oireita, kun poistut hoitopaikasta. Heidän pitää selittää Sinulle mitä Sinun pitää tehdä, jos saat oireita sen jälkeen, kun olet poistunut hoitopaikasta.

Lisätietoja ZYPADHERA-valmisteesta on pakkausselosteessa.

POTILAAN TIEDOT

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Yhteystiedot hätätilanteiden varalta