

Sürgős esetben  
kérjük hívja:

A készítményt felíró orvos

(név, rendelő/kórház neve,  
telefonszám):

Név:

Tel.:

Név:

Tel.:

Terápiás javaslat:

Szkizofrénia fenntartó kezelése  
felnőtt betegek esetében, ha  
állapotuk a szájon át szedett  
olanzapinnal végzett akut keze-  
lés során megfelelően stabilizá-  
lódott.

Minden alkalommal, amikor orvoshoz megy (beleértve a sürgősségi  
és baleseti sebészeti osztályt is), kérje meg az orvost, hogy nézze át  
és frissítse megfelelően az alábbi gyógyszerlistát!



Felírt gyógyszerek      Dátum:

| A gyógyszer neve | Adag | Mikor veszi be?<br>Naponta hányszor?<br>Reggel és este?<br>Étkezések után? | Dátumok<br>Kezdeté / vége | A gyógyszeresedés célja<br>Miért szedi? |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                  |      |                                                                            |                           |                                         |
|                  |      |                                                                            |                           |                                         |
|                  |      |                                                                            |                           |                                         |
|                  |      |                                                                            |                           |                                         |
|                  |      |                                                                            |                           |                                         |

| Adag (mg) | Milyen gyakran kapja<br>az injekciót? | Az utolsó injekció<br>adásának dátuma | Az utolsó injekció<br>ideje (óra, perc) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |
|           |                                       |                                       |                                         |

Olvassa el a biztonságosságra vonatkozó fontos információt ennek a lapnak a másik oldalán és a mellékelt betegtájékoztatóban!

**Szkizofrénia fenntartó kezelése felnőtt betegek esetében, ha állapotuk a szájon át szedett olanzapinnal végzett akut kezelés során megfelelően stabilizálódott.**

## Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti a következő elérhetőségeken keresztül:

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ  
Postafiók 450  
H-1372 Budapest  
Honlap: [www.ogyei.gov.hu](http://www.ogyei.gov.hu)  
elektronikus bejelentő form:  
<https://mellekhas.ogyei.gov.hu/>  
e-mail: [adr.box@nngyk.gov.hu](mailto:adr.box@nngyk.gov.hu)

illetve a **Radaydrug Kft**-nek is jelentheti a következő elérhetőségeken:  
Tel: +36 52 537 432  
email: [pharmacovigilance@radaydrug.com](mailto:pharmacovigilance@radaydrug.com)  
Kérjük, hogy bejelentését csak az egyik címre küldje el!

**Mint minden gyógyszer, így a készítmény is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.**

### Gyakori mellékhatások: 100 beteg közül 1-10 betegnél fordulnak elő

- A készítmény néha túl gyorsan kerülhet be a vérkeringésbe. Ha ez bekövetkezik, Ön az alábbi tüneteket tapasztalhatja az injekció beadása után. Egyes esetekben ezek a tünetek eszméletvesztéshez vezethetnek:

nagyfokú álmosság, szédülés, zavartság, tájékozódási zavar, beszédzavar, járászavar, izommerevség vagy remegés, gyengeség, ingerültség, erőszakosság (agresszió), szorongás, vérnyomás emelkedés, vagy görcsrohamok

- álmosság
- fájdalom az injekció beadása helyén

### Nagyon gyakori mellékhatások (10-ből egy betegnél fordulnak elő)

- Testtömeg-növekedés
- Álmosság
- A prolaktinszintek emelkedése a vérben
- A kezelés korai szakaszában előfordulhat szédülés vagy ájulás (lassú szívveréssel), különösen fekvő vagy ülő helyzetből történő felálláskor. Ez többnyire magától elmúlik, amennyiben nem, értesítse kezelőorvosát!

### Gyakori mellékhatások: 100 beteg közül 1-10 betegnél fordulnak elő

- bizonyos vesejtek és a keringő zsírok szintjének változásai, továbbá a kezelés korai szakaszában
- a májenzimszintek átmeneti emelkedése
- a cukorszint növekedése a vérben és a vizeletben
- a húgysav- és a kreatinin-foszforinázszint emelkedése a vérben
- fokozott éhségérzet
- szédülés
- nyugtalanág
- remegés
- szokatlan mozgások (diszkinéziák)
- székrekedés
- szájszárazság
- kiütés
- erőtlenség
- nagyfokú fáradtság
- vizvisszatartás, mely a kezek, bokák vagy a lábak feldagadásához vezet
- láz
- ízületi fájdalom
- szexuális zavarok, mint például a nemi vágy csökkenése férfiaknál és nőknél vagy merevedési zavar férfiaknál

Ha bármilyen mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a beteg tájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük értesítse kezelőorvosát.

A készítménnyel kapcsolatos további információk a beteg tájékoztatóban találhatók.

## AZ ÖN INJEKCIÓJÁT BEADTA

Név: \_\_\_\_\_

Cím: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Sürgős esetben az alábbi szám hívható:

\_\_\_\_\_

## Fontos információ a betegek számára

A ZYPADHERA néha túl gyorsan kerülhet be a vérkeringésbe, és ez a következő mellékhatásokhoz vezethet: nagyfokú álmosság, szédülés, zavartság, tájékozódási zavar, beszédzavar, járászavar, izommerevség vagy remegés, gyengeség, ingerültség, erőszakosság (agresszió), szorongás, vérnyomás-emelkedés, vagy görcsrohamok. A tünetek eszméletvesztéshez is vezethetnek.

### Ezért

- A fenti tünetek észlelésére az Ön kezelőorvosa vagy a nővér minden egyes injekció után legalább 3 órán keresztül megfigyelés alatt tartja Önt.
- Mielőtt távozna, a kezelőorvosnak vagy a nővérnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy Önnél nem lépett fel a fenti tünetek egyike sem.
- Bár nem valószínű, de a tünetek az injekció beadása után több mint 3 órával is kialakulhatnak. Ha ez bekövetkezik, azonnal értesítse kezelőorvosát vagy a szakszemélyzetet.
- Ennek kockázata miatt ne vezessen gépjárművet, illetve ne kezeljen gépeket az egyes injekciók után a nap hátralévő részében.

**Amíg még az orvosi rendelőben vagy a kezelő intézményben tartózkodik, feltétlenül közölje kezelőorvosával vagy a nővérral, ha:**

- nagyon álmossá éri magát.
- szédül
- zavart vagy tájékozódási zavart érez
- ingerültség vagy erőszakossá éri magát
- szorong
- beszédzavart vagy járászavart észlel
- gyengének éri magát
- izommerevséget vagy remegést észlel

Kezelőorvosának vagy a nővérnek ellenőriznie kell, hogy Ön éber és tünetmentes, mielőtt elhagyja az intézményt, és el kell magyarázniuk, hogy mit tegyen, ha a fentiek jelentkeznek, miután már távozott.

**A készítménnyel kapcsolatos további információk a beteg tájékoztatóban találhatók.**