

BŪTINIAUSIU ATVEJU SKAMBINKITE:

ZYPADHERA išrašantis gydytojas
(pavardė, gydymo įstaigos pavadinimas, telefono numeris):

BET KURIO APSILANKYMO PAS GYDYTOJĄ AR SPECIALISTĄ METU (ISKAITANT TRAUMŲ IR SKUBIOS PAGALBOS SKYRIŲ SPECIALISTUS), PERŽIŪRĖKITE IR ATNAUJINKITE KARTU SU JAIS ŠĮ MEDIKAMENTŲ SARAŠĄ.

Išrašyti medikamentai Data

Vardas, pavardė

Telefono numeris:

Vardas, pavardė

Telefono numeris:

Vaisto pavadinimas	Dozė mg, vienetai, milteliai, lašai	Kada vartojate šiuos vaistus? Kiek kartų per dieną? Ryte ir vakare? Po valgio?	Datos Vartojimo pradžia/ Vartojimo pabaiga	Tikslas Kodėl vartojate šiuos vaistus?

ZYPADHERA

Dozė (mg)	Kaip dažnai Jums skiriama injekcija?	Paskutinės injekcijos data	Paskutinės injekcijos laikas

Indikacija

Palaikomasis suaugusių žmonių
šizofrenijos, kurios ūmi fazė buvo
pakankamai stabilizuota gydant
geriamu olanzapinu gydymas.

Kitoje pusėje rasite svarbios informacijos apie vaisto saugumą. Taip pat pateikiame pilną informaciją apie vaisto išrašymą.

ZypAdhera

Olanzapino milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo suspensijai



Kaip ir kiti medikamentai, ZypAdhera gali sukelti šalutinius reiškinius, bet nebūtinai visiems pacientams.

Dažni šalutiniai reiškiniai pasireiškia nuo 1 iki 10 iš 100 vartojusių

Kartais ZYPADHERA į kraujotaką gali patekti per greitai. Taip atsitikus, po injekcijos gali atsirasti toliau išvardytų simptomų. Kai kuriais atvejais jie gali lemti sąmonės praradimą:

- Per didelis apsnūdimas, galvos svaigimas, minčių susipainiojimas, dezorientacija, sunkumas kalbėti, sunkumas vaikščioti, raumenų stingulys arba virpėjimas, dirglumas, agresija, nerimas, kraujospūdžio padidėjimas, traukuliai.

- Miegoistumas
- Skausmas injekcijos vietoje

Žemiau išvardinti šalutiniai reiškiniai stebėti, skiriant geriamą olanzapiną, tačiau galimi ir skiriant ZypAdhera.
Labai dažni šalutiniai pasireiškia 1-am iš 10 vartojusių

- Svorio padidėjimas
- Miegoistumas
- Prolaktino koncentracijos padidėjimas kraujyje
- Pradinė gydymo fazėje kai kuriems žmonėms svaigsta galva arba jie gali nualpti (jei retas širdies dažnis), ypačiai pereinant iš gulimos padėties į stovimą. Paprastai praeina savaime, bet jeigu nepraeina, pasakykite gydytojui.

Dažni šalutiniai reiškiniai pasireiškia nuo 1 iki 10 iš 100 vartojusių

- Kai kurių kraujo ląstelių ir cirkuliuojančių riebalų kiekybiniai pokyčiai
- Čukraus kiekio kraujyje ir šlapime padidėjimas
- Šlapimo rūgšties koncentracijos kraujyje padidėjimas ir šarminės fosfatazės suaktyvėjimas kraujyje
- Alkio jausmo sustiprėjimas
- Galvos svaigimas
- Nerimastingumas
- Drebulys
- Nejprasti judesiai (diskinezijos)
- Vidurių užkietėjimas
- Burnos džiūvimas
- Išbėrimas
- Silpnumas
- Labai didelis nuovargis
- Vandens kaupimasis, sukeliantis rankų, kulkšnių ir pėdų patinimą
- Karščiavimas
- Sąnarių skausmas
- Lytinės funkcijos sutrikimas, pavyzdžiui: lytinio potraukio susilpnėjimas vyrams ir moterims arba erekcijos funkcijos sutrikimas vyrams.

Jei bet kuris šalutinis poveikis tampa stiprus arba jei atsirado šalutinių reiškinių, kurie čia nepaminėti, prašome apie tai pranešti gydytojui.

Daugiau informacijos apie ZypAdhera galite rasti vaisto pakuotės vartotojui skirtame lapelyje.

SVARBI INFORMACIJA PACIENTUI

ZypAdhera kartais gali patekti į kraują per greitai ir dėl to sukelti sekančius šalutinius poveikius: perdėtą mieguistumą, galvos svaigimą, sumišimą, dezorientaciją, kalbos sutrikimą, apsunksintą ėjimą, raumenų sustingimą ar drebėjimą, silpnumą, sudirgimą, agresiją, nerimą, kraujo spaudimo padidėjimą, traukulius ir gali baigtis sąmonės praradimu.

Dėl šios priežasties:

- po kiekvienos injekcijos Jus stebės gydytojas ar sesutė mažiausiai 3 valandas, ar neatsirado minėti šalutiniai reiškiniai.
- Jūsų gydytojas ar sesutė, prieš Jums išvykstant, turi būti tikri, kad Jums neatsirado nei vienas iš minėtų simptomų
- Tačiau minėti simptomai gali atsirasti net ir praėjus 3 valandoms po injekcijos. Jei taip atsitinka, nedelsiant susisieki su gydytoju ar sesute.
- Dėl galimos rizikos, nevairuokite ar nevaldykite mechanizmų likusią dienos dalį po injekcijos.

Kol esate gydytojo kabinete ar įstaigoje, būtinai pasakykite gydytojui ar sesutei, jeigu Jūs:

- Jaučiatės labai mieguisti
- Jaučiate galvos svaigimą
- Jaučiatės sumišę ar dezorientuoti
- Jaučiatės sudirgę ar agresyviūs
- Jaučiate nerimą
- Pajutote kalbos ar vaikščiojimo problemų
- Jaučiate silpnumą
- Jaučiate raumenų sustingimą ar drebėjimą

Jūsų gydytojas ar sesutė privalo Jus patikrinti ir įsitikinti, kad Jūs esate įspėtas ir kad Jums nėra jokių neraminančių simptomų prieš Jums išvykstant iš gydymo įstaigos. Taip pat gydytojas ar sesutė privalo paaiškinti, ką daryti tuo atveju, jei minėti simptomai pasireiškia jau išvykus. Daugiau informacijos apie ZypAdhera galite rasti vaisto pakuotės vartotojui skirtame lapelyje.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant pakuotės lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais būdais: tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv>; užpildant paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formą, kuri skelbiama <https://vvkt.lrv.lt/lt>, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu [HYPERLINK](mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt) „mailto:NepageidaujamaR@vvkt.lt“NepageidaujamaR@vvkt.lt); nemokamu telefonu 8 800 73 568.

JŪSŲ INJEKCIJOS VALDYMAS

Vardas, pavardė

Adresas

Telefono numeris

Kontaktinis asmuo extra atveju



LT_001_EduMat_2024_02_V1