

W RAZIE NAGŁYCH PRZYPADKÓW PROSIMY DZWONIĆ:

Imię i nazwisko lekarza przepisu-
jącego terapię lekiem ZypAdhera:

Adres praktyki lekarskiej
/nazwa szpitala:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Wskazania do stosowania:

Leczenie podtrzymujące dorosłych
pacjentów ze schizofrenią, u których
uzyskano odpowiednią stabilizację
podczas leczenia olanzapiną
w postaci doustnej.

PODZAS KAŻDEJ WIZYTY U LEKARZA (WŁĄCZAJĄC NAGŁE WYPADKI I INTERWENCJE POGOTOWIA RATUNKOWEGO)
POKAŻ KARTĘ LECZENIA I PROŚ O UAKTUALNIENIE

Przepisane leki Data: _____

Nazwa leku	Dawka <i>mg, krople, opakowania, inhalacje</i>	Dawkowanie <i>Ile razy dziennie? O jakiej porze dnia? Przed/po posiłku?</i>	Data <i>Rozpoczęcia /Zakończenia</i>	Powód przyjmowania <i>Dlaczego powinieneś zażyć lek?</i>

ZYPADHERA

Dawka <i>(mg)</i>	Jak często otrzymujesz wstrzyknięcia?	Data ostatniego wstrzyknięcia	Godzina ostatniego wstrzyknięcia

W celu uzyskania informacji o bezpieczeństwie terapii zapoznaj się z treścią zamieszczoną na drugiej stronie ulotki lub z pełną charakterystyką produktu leczniczego.

Jak każdy lek, ZypAdhera może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdego.

Częste działania niepożądane: występują u 1-10 na 100 pacjentów

- ZypAdhera może czasami zbyt szybko przeniknąć do naczyń krwionośnych. W takiej sytuacji mogą wystąpić objawy niepożądane wymienione poniżej. Te objawy mogą prowadzić do utraty przytomności:
 - nadmierna senność, zawroty głowy, splątanie, dezorientacja, trudności z mówieniem, trudności z chodzeniem, sztywność mięśni lub drżenie, osłabienie, drażliwość, agresja, lęk, wzrost ciśnienia krwi lub drgawki
- senność
- ból w miejscu wstrzyknięcia

Działania niepożądane, wymienione poniżej, występowały podczas podawania olanzapiny w postaci doustnej. Mogą one wystąpić także po podaniu leku ZypAdhera.

Bardzo częste działania niepożądane: występujące u 1 na 10 pacjentów

- zwiększenie masy ciała
- senność
- zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi
- we wczesnym okresie leczenia niektóre osoby mogą odczuwać zawroty głowy i omdlenia (z wolnym tętnem), szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej i siedzącej. Te objawy zwykle przechodzą samoczynnie, ale jeżeli tak się nie stanie, należy powiadomić lekarza.

Częste działania niepożądane: występujące u 1-10 na 100 pacjentów

- zmiany w liczbie niektórych komórek krwi i stężenia lipidów w krwioobiegu i we wczesnej fazie leczenia okresowy wzrost enzymów wątrobowych
- zwiększenie stężenia cukru we krwi i moczu
- zwiększenie stężenia kwasu moczowego i fosfatazy kreatynowej we krwi
- wzmożone uczucie głodu
- zawroty głowy
- niepokój
- drżenie
- nieprawidłowe ruchy (dyskinezy)
- zaparcia
- suchość błony śluzowej jamy ustnej
- wysypka
- utrata siły
- skrajne zmęczenie
- zatrzymanie wody w organizmie powodujące obrzęki rąk, stóp lub okolicy kostek
- gorączka
- ból stawów
- zaburzenia funkcji seksualnych jak, obniżony poziom libido u mężczyzn i kobiet oraz zaburzenia wzwodu u mężczyzn

Jeżeli któreś z wymienionych działań niepożądanych stają się poważne lub jeżeli obserwujesz objawy uboczne niewymienione powyżej, skontaktuj się z lekarzem.

Więcej informacji dotyczących preparatu ZypAdhera znajdziesz w ulotce dla pacjenta.

Wskazania do stosowania:

Leczenie podtrzymujące dorosłych pacjentów ze schizofrenią, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej.



WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTA

ZypAdhera może czasami zbyt szybko przeniknąć do naczyń krwionośnych, co może prowadzić do wystąpienia następujących objawów: nadmierna senność, zawroty głowy, splątanie, dezorientacja, zaburzenia mowy, zaburzenia chodu, sztywność lub drżenie mięśni, osłabienie, drażliwość, agresja, lęk, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, lub drgawki. W niektórych przypadkach objawy te mogą prowadzić do utraty przytomności.

W takich sytuacjach:

- po każdym wstrzyknięciu będziesz obserwowana(-y) w placówce służby zdrowia przez przynajmniej 3 godziny ze względu na możliwość wystąpienia powyższych objawów
- zanim opuścisz placówkę służby zdrowia, lekarz lub pielęgniarka powinni mieć pewność, że nie występują u Ciebie powyższe objawy
- wystąpienie objawów po czasie dłuższym niż 3 godziny po wstrzyknięciu jest mało prawdopodobne; jednak w przypadku ich wystąpienia natychmiast powiadom lekarza lub pielęgniarkę
- z powodu powyższego ryzyka nie prowadź pojazdów mechanicznych i nie obsługuj maszyn przez pozostałą część dnia po podaniu leku

Podczas pobytu w placówce służby zdrowia, zgłoś lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli czujesz:

- nadmierną senność
- drażliwość
- zmieszanie lub dezorientację
- poirytowanie lub agresję
- lęk
- trudności z mówieniem lub chodzeniem
- osłabienie
- sztywność lub drżenie mięśni

Lekarz lub pielęgniarka muszą sprawdzić przed wyjściem, czy jesteś świadoma(-y) i czy nie występują żadne z wyżej wymienionych objawów.

Powinni też wytłumaczyć Tobie, co należy robić w przypadku wystąpienia objawów po opuszczeniu placówki.

Więcej informacji dotyczących preparatu ZypAdhera znajdziesz w ulotce dla pacjenta.

DANE PACJENTA

Imię: _____

Adres: _____

Telefon: _____

Kontakt w nagłych przypadkach: _____