

Liksom alla läkemedel kan också ZYPADHERA orsaka biverkningar, men alla användare får inte biverkningar nödvändigtvis.

Vanliga biverkningar: uppträder hos 1 till 10 användare av 100

- ZYPADHERA kan ibland komma in i blodomloppet alltför snabbt och detta kan leda till följande biverkningar efter injektionen. Ibland kan symptomen leda till medvetslöshet, sömnlighet
- smärta på injektionsstället

Biverkningarna nedan har observerats när olanzapin har intagits oralt (genom munnen), men de kan även uppkomma efter ZYPADHERA-injektion.

Mycket vanliga biverkningar: uppträder hos 1 användare av 10

- viktökning
- sömnlighet
- ökad prolaktinhalt i blodet.

Vanliga biverkningar: uppträder hos 1 till 10 användare av 100

- förändringar i mängden av vissa blodkroppar och blodfetter
- ökad sockernivå i blodet och urinen
- hungerkänsla
- yrsel
- rastlöshet
- diarréer
- muskelstelhet eller spasmer (inklusive ögonrörelser)

- talsvårigheter
- ofrivilliga rörelsestörningar (särskilt i ansikte eller tunga)
- förstoppning
- muntorrhet
- utslag
- kraftlöshet
- extrem trötthet
- vätskeansamling som leder till svullnader i händerna, vristerna eller fötterna
- I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam puls) särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om symptomen inte försvinner, kontakta Din läkare.

Om några biverkningar blir värre eller om Du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

Närmare information finns i bipacksedeln.

ZYPADHERA kan ibland gå in i blodet alltför snabbt. Om detta inträffar, kan Du få följande symptom efter injektionen: extrem sömnlighet, yrsel, muskelstelhet eller skakningar, svaghet, irritabilitet, aggression, ångest, ökat blodtryck eller kramper som i vissa fall kan leda till medvetslöshet.

Därför:

- kommer Du att observeras av personal på vårdenheten med avseende på uppkomst av ovanstående symptom i minst 3 timmar.
- Åk inte ensam från vårdenheten efter injektionen och avslutad observation.
- Personalen på vårdenheten kontrollerar att Du inte har ovan nämnda symptom.
- Det är inte sannolikt att Du får sådana symptom efter mer än 3 timmar efter injektionen. Om detta trots allt inträffar, ska Du genast ta kontakt med Din läkare eller sjuksköterska.
- På grund av denna risk ska Du inte köra bil eller hantera maskiner under återstoden av dagen efter injektionen.

Tala om för Din läkare eller sjuksköterska då Du är på vårdenheten om

- Du är väldigt sömning
- Du känner Dig yr
- Du känner Dig förvirrad
- Du är irriterad eller aggressiv
- Du är ångestfylld
- Du har svårt att tala eller gå
- Du känner Dig svag
- Du känner att Dina muskler är stela eller att de darrar

Personalen på vårdenheten ska kontrollera att Du är alert och symptomfri, då Du lämnar vårdenheten. De ska också förklara för Dig hur Du ska göra, om Du får besvär sedan Du lämnat vårdenheten.

Ytterligare information om ZYPADHERA ingår i bipacksedeln som finns i förpackningen.

ZYPAdheraTM
Olanzapin, pulver och vätska till
injektionsvätska, depotsuspension

Injektionsbehandling med ZYPADHERA

Namn :

Adress:

Telefonnummer :

Kontaktinformation i nödfall

.....
.....
.....
.....
.....

Vid nödfall, kontakta:

Läkaren som ansvarar för behandlingen med ZYPADHERA (läkarens namn, namnet på vårdenheten/sjukhuset, telefonnummer)

Namn

Telefonnummer

Namn

Telefonnummer

Vid akuta nödfall kan också det allmänna nödnumret kontaktas: 112



Zyprexa (olanzapin) N05AH03 Rx. **Indikationer:** Behandling av schizofreni, måttlig till svår manisk episod samt som profylaktisk behandling av återfall i bipolär sjukdom för patienter som svarat på olanzapin vid behandling av akut mani. **Beredningsformer:** Dragerad tablett 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg. Velotab, frystorkad tablett 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg. **Dosering:** Schizofreni, startdos 10 mg/dag. Manisk episod, startdos 15 mg/dag vid monoterapi eller 10 mg/dag vid kombinationsbehandling.Profylax av återfall i bipolär sjukdom, startdos 10 mg/dag. Patienter som fått olanzapin för behandling av manisk episod kan fortsätta med samma dos för den profylaktiska behandlingen. Dosen kan därefter, vid behandling av schizofreni, manisk episod och profylax av återfall i bipolär sjukdom, anpassas individuellt inom dosområdet 5–20 mg dagligen beroende på patientens kliniska respons. Datum för översyn av produktresumén, 2024-02-08. För ytterligare information och pris se www.fass.se.

SE-001_EdMkMk 2024_02_V1

ALLTID DÅ DU BESÖKER LÄKARENS MOTTAGNING (OCKSÅ AKUT), ÄR DET BRA ATT TILLSAMMANS MED LÄKAREN GÅ IGENOM DENNA LÄKEMEDELSFÖRTECKNING, OCH GÖRA EVENTUELLA RÄTTELSE

Receptbelagda mediciner

Datum:

Medicinens namn	Dos Mg/enhet/ inhalationsgångar/ droppar	När skall medicinen tas? Hur många gånger dagligen? Morgon och kväll? Efter måltid?	Datum Påbörjades, Avslutades	Syfte (indikation) Varför tar du läkemedlet?

ZYPADHERA™

Dos (mg)	Hur ofta får Du injektionen?	Föregående injektion, datum	Föregående injektion, klockslag

Läs också vändsidan och bipacksedeln som finns i ZYPADHERA förpackningen. Där finns viktig säkerhetsinformation för Dig.