

ZYPADHERA

ZYPADHERA tilhører en gruppe legemidler kalt antipsykotika og brukes i behandlingen av schizofreni; en sykdom med symptomer som å høre, se eller føle ting som ikke eksisterer, vrangforestillinger, ualminnelig mistenksomhet og tilbakeholdenhet. Mennesker med denne lidelsen kan også føle seg deprimerede, nervøse eller spente. Som alle legemidler kan ZYPADHERA forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Vanlige bivirkninger kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere

- ZYPADHERA kan noen ganger gå over i blodbanen for fort, noe som kan føre til følgende bivirkninger: ekstrem søvnighet, svimmelhet, forvirring, desorientering, vanskelig for å snakke, vanskelig for å gå, muskelstivhet eller risting, svakhet, irritabilitet, aggresjon, angst, økning i blodtrykk eller krampes og kan føre til bevisstløshet
- Søvnighet
- Smerte på injeksjonsstedet

Følgende bivirkninger er observert når olanzapin er blitt gitt gjennom munnen, men kan også forekomme ved bruk av ZYPADHERA

Svært vanlige bivirkninger kan forekomme hos mer enn 1 av 10 brukere

- Vektøkning
- Økning av prolaktininnhold i blodet
- Noen mennesker kan føle seg svimle eller besvime (med lav hjerterytme) i starten av behandlingen, spesielt når de reiser seg fra liggende eller sittende stilling. Dette vil som regel gå over av seg selv, men om det ikke forsvinner, skal du snakke med legen din

Vanlige bivirkninger kan forekomme inntil 1 av 10 brukere

- Nivåendringer av enkelte blodceller, sirkulerende fettstoffer og tidlig i behandlingen midlertidig økning i leverenzymmer
- Forhøyet blodsukker og urinsukker
- Økt sultfølelse
- Økning i nivåer av urinsyre og kreatinase
- Svimmelhet
- Rastløshet
- Skjelving
- Uvanlige bevegelser dyskinesier

- Forstoppelse
- Tørrehet i munnen
- Utslett
- Følelse av svakhet
- Ekstrem tretthet
- Vannansamling som fører til hevelse i hender, anklær eller føtter
- Seksualproblemer som nedsatt sexlyst hos menn og kvinner eller ereksjonsproblemer hos menn
- Feber
- Leddsmerter

Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pasientkortet.

Ytterligere informasjon om ZypAdhera kan du finne i pakningsvedlegget.

VIKTIG INFORMASJON TIL PASIENTER

ZYPADHERA kan noen ganger komme inn i blodbanen for raskt. Dersom dette skjer, kan du etter injeksjon få symptomene som er listet opp nedenfor. Ekstrem søvnighet, svimmelhet, forvirring, desorientering, irritabilitet, angst, aggresjon, økning i blodtrykk, vanskelig for å snakke, svakhet, vanskelig for å gå, muskelstivhet eller risting og krampes. I noen tilfeller kan disse symptomene føre til bevisstløshet.

Dette fører til følgende:

- I minst tre timer etter injeksjon vil du være til observasjon hos helsepersonell for de ovennevnte symptomene
- Din lege eller sykepleier må før du drar forsikre seg om at du ikke har noen av de ovennevnte symptomene

- Du kan få symptomene mer enn tre timer etter injeksjonen, selv om dette er usannsynlig. Vær oppmerksom på symptomer på postinjeksjonssyndrom resten av dagen og sørg for at du har mulighet for assistanse dersom det blir nødvendig
- På grunn av denne risikoen skal du ikke kjøre alene eller bruke maskiner resten av dagen etter injeksjon

Mens du fortsatt er på sykehusavdelingen eller legens kontor, så må du snakke med legen eller sykepleieren om du opplever noen av symptomene som er beskrevet ovenfor.

Din lege eller sykepleier vil forsikre seg om at du er våken, orientert og uten tegn på ovennevnte symptomer før du forlater avdelingen/kontoret. De vil også forklare hva du skal gjøre om du opplever noen av disse symptomene etter at du har dratt hjem.

Ytterligere informasjon om ZypAdhera vil du finne i pakningsvedlegget.

Sist oppdatert: Februar 2024

NO_001_EduMat_2024_02_V1

ADMINISTRERING AV DIN INJEKSJON

Navn:

Adresse:

Telefon:

Kontaktinformasjon ved nødstilfelle:

ZYPAdhera[®]
Olanzapin og væske til
depotinjeksjonsvæskesuspensjon.

CHEPLAPHARM Registration GmbH,
Weiler Strasse 5a, 79540 Lörrach,
Tyskland.



VED NØDSTILFELLE,
VENNLIGST KONTAKT:

ZYPADHERA FORSKRIVENDE LEGE

Navn:

Avdeling:

Sykehus:

Telefonnr:

Lokal legevakt

Telefonnr:



INDIKASJON

Vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne
som er tilstrekkelig stabilisert under akuttbehandling
med oral olanzapin

Når du er i kontakt med lege eller spesialist (inkludert i tilfeller ved ulykke og akuttavdelinger),
gå gjennom og oppdater medikamentlisten med dem.

Foreskrevet medikament

Dato:

Navn på medikament	Dose mg, enheter, dråper	Når tar du medikamentet? Hvor mange ganger om dagen? Morgen og kveld? Etter måltider?	Dato Start/stopp	Årsak Hvorfor tar du medikamentet?

ZypAdhera

Dose (mg)	Hvor ofte får du din injeksjon?	Dato for siste injeksjon	Tidspunkt for siste injeksjon

For viktig sikkerhetsinformasjon, se den andre siden av dette kortet samt pakningsvedlegget.