

ZYPADHERA®

Olanzapine pamoaat

Telkens als u in contact treedt met een arts of specialist (ook bij een ongeval of eerstehulppost) dient u deze medicatielijst met deze persoon te bekijken en daar waar nodig aan te laten vullen.

Waarschuwingskaart voor
patiënten en hun behandelaar.

Voorgeschreven geneesmiddelen

Datum: _____

Naam van het geneesmiddel	Dosering mg, eenheden, aantal pufs, druppels	Wanneer gebruikt u dit? Hoe vaak per dag? 's Morgens of 's avonds? Na de maaltijd?	Datum Start / Stop	Doel Waarom gebruikt u dit?

ZYPADHERA

Dosering (mg)	Hoe vaak krijgt u een injectie?	Datum van de laatste injectie	Tijd van de laatste injectie

Zie voor belangrijke veiligheidsinformatie de achterzijde van deze kaart en/of de patientenbijsluiter in de verpakking van uw geneesmiddel of via www.zypadhera.info/nl/

Neem in geval van nood contact op met:

ZypAdhera voorschrijvende arts

Naam: _____

Praktijk- instellingsadres: _____

Telefoon: _____

Eventuele andere personen

Naam: _____

Telefoon: _____

Naam: _____

Telefoon: _____

Belangrijke informatie voor patiënten

ZypAdhera kan soms te snel in de bloedstroom terechtkomen. Als dit gebeurt, kunt u na uw injectie de volgende verschijnselen krijgen:

- overmatige slaperigheid
- duizeligheid
- verwardheid
- desoriëntatie
- moeite met praten
- moeite met lopen
- spierstijfheid of spiertrillingen
- zwakte
- prikkelbaarheid
- agressie
- angst
- verhoogde bloeddruk
- epileptische aanvallen

Zij kunnen leiden tot bewustzijnsverlies. Deze verschijnselen verdwijnen gewoonlijk binnen 24 tot 72 uur na uw injectie. Daarom wordt u na iedere injectie minimaal 3 uur door uw arts of verpleegkundige geobserveerd op bovengenoemde verschijnselen. De verschijnselen kunnen ook later dan 3 uur na de injectie optreden, al is dat onwaarschijnlijk. Als dit gebeurt, dient u direct contact op te nemen met uw arts of verpleegkundige. Vanwege dit risico mag u na iedere injectie de rest van de dag niet meer autorijden of machines bedienen.

Vertel het de arts of verpleegkundige als u zich na de injectie duizelig voelt of flauwvalt. U zult waarschijnlijk moeten gaan liggen tot u zich beter voelt. Mogelijk wil de arts of verpleegkundige ook uw bloeddruk en pols opnemen.

Uw arts of verpleegkundige moeten ervan verzekerd zijn dat u alert en vrij van bovengenoemde verschijnselen bent voordat u de instelling verlaat. Zij moeten u uitleggen wat u moet doen als dit gebeurt als u de instelling verlaten heeft.

Wilt u meer informatie over uw medicijn? Lees de bijsluiter of scan de QR-code voor het online materiaal. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

